


Raskustunne peas?

Nina kinni?

Köha?



GeloMyrtol® forte
Standardiseeritud mürtool

Parem tunne juba esimesel päeval!

Gelomyrtol forte (standardiseeritud mürtool) pakub uut lähenemist hingamisteede põletike raviks.

Vanasti raviti köha ja nohu sa-geli nii, et nägu asetati kuuma veega täidetud kausi kohale, pea kaeti käterätikuga ja sellises telgis hingati sisse kuuma auru ehk inhaleeriti. See oli küll hea raviviis, ent tülikas ja aeganõudev.

Gelomyrtol forte (standardiseeritud mürtool) ühendab vanad traditsioonid tänapäevase teadusega. Selle loodusliku ravimi toime põhineb “seespidisel” inhalatsioonil.

Mis on “seespidine” inhalatsioon?

Gelomyrtol forte kapsel sisaldab toimeainena standardiseeritud mürtooli. Mürtool on taimne eeterlike õlide segu.

Kapsli sissevõtmisel hakkavad eeterlikud õlid kopsude ja hingamisteede kaudu organismist väljuma ning tekib “seespidine” inhalatsioon. Läbides hingamisteed, soodustab mürtool röga ja lima pehmenemist,



kergendab väljakõhimist ning nuuskamist. Lisaks toimib mürtool ka põletikuvastaselt. Tänu “seespidisele” inhalatsioonile paraneb enesetunne oluliselt juba esimesel ravipäeval.

Millal kasutada?

Gelomyrtol forte (standardiseeritud mürtool) kapsleid kasutatakse ülemiste ja alumiste hingamisteede põletike korral, sh ägeda ja kroonilise sinusiidi ning bronhiidi korral.

Kuidas kapsleid võtta?

Täiskasvanud ja üle 10-aastased lapsed võtavad ägeda põletiku korral 1 kapsli 3...4 korda päevas. Kroonilise põletiku korral 1 kapsli 2 korda päevas.

Alla 10-aastased lapsed võtavad ägeda põletiku korral 1 kapsli 1...2 korda päevas. Kroonilise põletiku korral 1 kapsli päevas.

Kapsel tuleb neelata alla tervelt (mitte närida) koos rohke jaheda vedelikuga pool tundi enne sööki.

- Vedeldab sekreeti hingamisteedes
- Soodustab limaeritust
- Alandab limaskestast turset
- Kergendab väljakõhimist ja nuuskamist
- Avaldab põletikuvastast toimet



Käsimüügiravim.
Näidustus: Sekreedi vedeldamine sinusiidi ja bronhiidi korral.
Tähelepanu! Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.

Tootja ja müügiloo hoidja: G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG, Saksamaa
Täiendav informatsioon müügiloo hoidja esindajalt Eestis: OÜ KBM Pharma, Tähtvere 4, 51007, Tartu, Eesti. Tel. 733 8080